

消毒薬の使用方法など

消毒対象	消毒薬	調整方法	使用方法
屋外 (し尿槽や下水があふれた場所、動物の死骸や腐敗物が漂着した場所、氾濫した汚水が付着した壁面、乾燥しにくい床下)	クレゾール 石けん	クレゾール石けん液 30ml に水を加えて1リットルとする。液が濁って沈殿物が生じた場合には上澄液を使用する。	消毒家屋の周りは、じょうろや噴霧器などで濡れる程度に散布する。臭いが強いので注意する。壁面は、泥などの汚れを水で落としてから、消毒薬をひたした布などでよく拭く。または噴霧器で噴霧する場合は、濡れる程度に噴霧する
	オルソ剤	オルソ剤 20ml に水を加えて、1 リットルとする。	
	消石灰	浸水した床下・家の周囲等に、消石灰を表面が白く覆われる程度 (300g/cm ²) の量を散布する。散布した消石灰が飛散しないよう、ジョウロ等で軽く水をまいて、表面の消石灰を固める。消石灰は水との接触で発熱するので注意！ 消石灰が皮膚につくとやけどするので注意！	
屋内 (汚水に浸った壁面や床、家財道具)	逆性石けん (オスバン等)	塩化ベンザルコニウムまたは塩化ベンゼトニウムとして 0.1~0.2%の濃度になるよう希釈する。 (10%製品の場合、本剤 100~200ml に水を加えて 10 リットルとする)	泥などの汚れを洗い流すか、雑巾などで水拭きしてから、 <u>十分に乾燥させた後</u> 、薄めた液を浸した布などでよく拭く。 (噴霧器で噴霧した場合は、濡れる程度に噴霧する。その後、風通しをよくしてそのまま乾燥させる。)
手指 (後片付けなどで、汚染された場所や土に触れた手指)			汚れを石けんで洗ったあと、流水で石けんをよく落とし (石けんが残っていると殺菌力が低下します)、洗面器などに入れた消毒液に手首まで浸し、30 秒以上もみ洗いする。その後、乾いたタオルなどで、よくふき取る。
食器類	次亜塩素酸ナトリウム (家庭用塩素系漂白剤でも可)	次亜塩素酸ナトリウムの濃度が 0.02% になるよう希釈する。(10%製品を使用する場合は、本剤 2ml に水を加えて 1 リットルとする。)	食器を水洗いした後、消毒液に 5 分以上浸し、その上で自然乾燥させる。
井戸水			残留塩素として 1~2ppm の濃度になるように調整する。(10%製品を使用する場合は、水 1 リットルにつき 1 滴を加える。)